


BDP® TMR NHS-Ester


<http://de.lumiprobe.com/p/bdp-tmr-nhs-ester>

BDP TMR ist ein Borondipyrrromethen-Fluorophor. Bei diesem Derivat handelt es sich um einen aminreaktiven NHS-Ester zur Markierung von Proteinen, Peptiden oder anderen Molekülen, die eine Aminogruppe tragen.

BDP TMR ist ein Fluorophor für TAMRA-Filtersätze, der dabei aber deutlich heller ist als TAMRA. Aufgrund der recht langen Lebensdauer des angeregten Zustands ist dieser Fluorophor eine gute Wahl für Fluoreszenzanisotropiemessungen. Fluoreszenzpolarisation ist eine ausgezeichnete Methode für Hochdurchsatz-Bindungsassays.



Struktur der BDP-TMR-NHS-Ester



Absorptions- und Emissionsspektren von BDP TMR

Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:	violetter Feststoff
Gewichtsspezifisches M+-Inkrement:	380.2
Molekülmasse:	495.28
CAS-Nummer:	485397-12-4
Molekülformel:	C ₂₅ H ₂₄ BF ₂ N ₃ O ₅
Löslichkeit:	gut löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln (DMF, DMSO, DCM, Aceton etc.)
Qualitätskontrolle:	NMR ¹ H, HPLC-MS (95 %)
Lagerungsbedingungen:	Lagerung: 12 Monate ab Wareneingang bei -20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur für bis zu 3 Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern.
Rechtliche Hinweise:	Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm:	542
ε / L·mol ⁻¹ ·cm ⁻¹ :	55000
Emissionsmaximum / nm:	574
Fluoreszenz-Quantenausbeute:	0.64

CF₂₆₀: 0.16

CF₂₈₀: 0.16

BDP® ist eine Marke von Lumiprobe