

## Pyrenbuttersäure NHS-Ester


<http://de.lumiprobe.com/p/pyrene-nhs-ester>

Pyren ist ein polyaromatischer zyklischer Kohlenwasserstoff mit blauer Fluoreszenz. Sobald zwei Pyrenmoleküle in geringem Abstand zueinander vorliegen, ist Excimer-Fluoreszenz mit einer höheren Wellenlänge zu beobachten. Dadurch kann Pyren gut als Abstandssensor eingesetzt werden.


Pyren weist außerdem eine Affinität zu Graphit auf und kann daher als Ankergruppe für Graphit genutzt werden. Dieses Reagenz kann an Biomoleküle gebunden werden, um sie anschließend auf Graphitoberflächen zu immobilisieren.

Die Funktionalisierung als NHS-Ester erlaubt die Markierung von Biomolekülen mit Aminogruppen (Proteine, Peptide, Amino-DNA und weitere).

Pyren ist außerdem ein FRET-Donor für Perylen.



**Struktur von Pyrenbuttersäure NHS-Ester**



**Absorptions- und Emissionsspektren von Pyren**

### Allgemeine Eigenschaften

|   |  |
|---|--|
| Erscheinungsform:                               | gebrochen weißer Feststoff   |
| Gewichtsspezifisches M <sup>+</sup> -Inkrement: | 270.1  |
| Molekülmasse:                                   | 385.41   |
| CAS-Nummer:                                     | 114932-60-4  |
| Molekülformel:                                  | C <sub>24</sub> H <sub>19</sub> NO <sub>4</sub>  |
| IUPAC-Name:                                     | 1-Pyrenebutanoic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester  |
| Löslichkeit:                                    | gut löslich in DCM, Chloroform; mäßig löslich in DMF, DMSO; schlecht löslich in Wasser   |
| Qualitätskontrolle:                             | NMR <sup>1</sup> H, HPLC-MS (≥95 %)  |
| Lagerungsbedingungen:                           | Lagerung: 12 Monate nach Wareneingang bei -20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur für bis zu 3 Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern.   |
| Rechtliche Hinweise:                            | Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen. |

### Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: 343; 326; 313; 276; 265; 242; 234

Emissionsmaximum / nm: 377; 397